



Schädlingsfrei CAREO® Rosenspray

Akarizid, Insektizid.

Sonstige Flüssigkeiten zur unverdünnten Anwendung.

Wirkstoff: 0,05 g/L (0,005 Gew.-%) Acetamiprid

Substral Celaflor Schädlingsfrei Careo Rosenspray ist ein gebrauchsfertiges Pumpspray zur Anwendung an Zierpflanzen. Der Wirkstoff wird in die Blätter der Pflanzen aufgenommen und im Saftstrom verteilt (vollsistemische Wirkung). Substral Celaflor Schädlingsfrei Careo Rosenspray bekämpft saugende und beißende Schädlinge wie Blattläuse, Thripse, Weiße Fliege, Schild-, Woll- und Schmierläuse, Spinnmilben sowie Käfer, Raupen, Minierer u.a. Durch den enthaltenen Ölanteil werden auch die Larven- und Eistadien bekämpft.



Zulassungsinhaber und Vertrieb in Deutschland:

Evergreen Garden Care Deutschland GmbH

Wilhelm-Theodor-Römhild-Straße 30
D-55130 Mainz, Tel. 01805/780300

(0,14 €/Min. a. d. dt. Festnetz.
Max. 0,42 €/Min. aus den
Mobilfunknetzen.)

www.celaflor.de

Inhalt:

750 ml e

Nr. 005982-60



Bundesamt für
Gütesicherung
und
Technische
Überwachung

ZUGELASSEN



Sicherheitsverschluss
① = drücken
② = drehen

1098/66300 CLP



↓ Hier öffnen

Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanweisung einhalten.
Anwendung durch nichtberufliche Anwender zulässig.
Von der Zulassungsbehörde festgelegte Anwendungsgebiete und -bestimmungen:

Anwendungsbereich	Schadorganismus	Anwendungsart/ Anwendungsmenge	Anwendungszeit
Zierpflanzen inkl. Ziergehölze (Freiland)	Saugende und beißende Insekten, Schildlaus- Arten, Schmierläuse, Weiße Fliege	Unverdünnt behandeln bis zur sichtbaren Benetzung	Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbar- werden der ersten Symptome/ Schadorganismen
Zierpflanzen (Gewächshaus) Zimmerpflanzen (Büroräume, Balkon, Zimmer)	Saugende und beißende Insekten, Schildlaus- Arten, Schmierläuse, Weiße Fliege Spinnmilben	Max. Zahl der Behandlungen 4 je Kultur bzw. je Jahr jeweils im Abstand von 10 - 14 Tagen. Pflanzen aus 50 cm Abstand leicht einsprühen - auch die Blattunterseiten.	

Beißende Insekten wie z.B. Käfer, Raupen, Minierer, Gespinstmotten, Wickler.

Saugende Insekten wie z.B. Blatt- und Wollläuse, Thripse, Zikaden, Wanzen u.a.

Die festsetzung einer Wartezeit ist ohne Bedeutung (N).

Anwendung nur in den Gebrauchsanleitung genannten Anwendungsgebiet und nur zu den hier
beschriebenen Anwendungsbedingungen.

Anwendung: Vor Gebrauch schütteln! Befallene Pflanzen bis zur sichtbaren Benetzung
einsprühen, auch die Blattunterseiten. Dabei einen Abstand von mindestens 50 cm einhalten.
Bei Bedarf nach 10-14 Tagen nachbehandeln.

Zusätzliche Hinweise zur Anwendung: Substral Celaflor Schädlingsfrei Careo Rosenspray ist in
der Regel gut pflanzenverträglich. Da bei der großen Zahl der Pflanzenarten und- sorten
unterschiedliche Verträglichkeiten auftreten können, empfiehlt es sich, vor der Spritzung des
gesamten Bestandes die Empfindlichkeit an einzelnen Pflanzen zu prüfen und über einen

Zeitraum von 10 Tagen beobachten. In seltenen Fällen können leichte Spritzbeläge auftreten,
die aber nicht pflanzenschädlich sind. Nicht anwenden an Weihnachtssternen und Kalanchoen.
Keine Anwendung bei hohen Temperaturen (> 25°C) oder direkter Sonneneinstrahlung.
Empfindliche Oberflächen wie Möbel, Bodenbeläge o.ä. durch unterlegen von Papier vor dem
leicht öligen Sprühnebel schützen.

Hinweise zum Schutz des Anwenders: Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. Ist ärztlicher
Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Inhalt/Behälter mit
eventuell Produktresten an Sammelstellen für Haushaltschemikalien zuführen. Für Kinder und
Haustiere unzugänglich aufbewahren. Jeden unnötigen Kontakt mit dem Mittel vermeiden.
Missbrauch kann zu Gesundheitsschäden führen. Beim Umgang mit dem Produkt nicht essen,
trinken oder rauchen. Für Kinder und Haustiere unzugänglich aufbewahren. Raum nach der
Behandlung von Zimmerpflanzen verlassen und nach etwa 30 Minuten durch Öffnen der Fenster
ca. 30 Minuten durchlüften.

Erste Hilfe: Nach Hautkontakt mit reichlich Wasser waschen. Nach Augenkontakt sofort mit
reichlich Wasser ausspülen, auch unter den Augenlidern. Nach Verschucken Mund mit Wasser
auspülen, Arzt aufsuchen und Etikett/Verpackung vorzeigen.

Hinweise zum Schutz der Umwelt: Das Mittel wird bis zu der höchsten durch die Zulassung
festgelegten Aufwandmenge oder Anwendungskonzentration, falls eine Aufwandmenge nicht
vorgesehen ist, als nicht bienengefährlich (B4) eingestuft. Das Mittel wird als nicht schädigend
für Populationen der Arten Aleochara bilineata (Kurzflügelkäfer), Pardosa amentata und
palustis (Wolfspinne) eingestuft. Das Mittel wird als schwach schädigend für Populationen der
Arten Poecilus cupreus (Laufkäfer), Chrysoperla carnea (Florfliege) und Typhlodromus pyri
(Raubmilbe) sowie als schädigend für Coccinella septempunctata (Siebenpunkt-Marienkäfer)
eingestuft. Das Mittel ist giftig für Fischnährtiere. Mittel und dessen Reste sowie entleerte
Behälter und Packungen nicht in Gewässer gelangen lassen. Indirekte Einträge über Hof und
Straßenabläufe verhindern.

Lagerung und Entsorgung: Kühl und trocken und frostfrei lagern Behälter mit eventuellen Produkt-
resten an Sammelstellen für Haushaltschemikalien zuführen. Da die Anwendung des Mittels außer-
halb unseres Einflusses liegt, übernehmen wir eine Haftung nur für gleichbleibende Qualität.